


國仁醫院

0-14皮膚牽引之注意事項

- 一、每1~2小時由他人協助翻身，可促進食慾及預防肺炎的發生，並可避免皮膚有破皮、褥瘡之情形。
- 二、每日協助病人清潔皮膚，尤其是臀部、背部、腳跟易受壓處，並觀察有無水泡、擦傷、水腫等，且如有搔癢、灼熱、發麻等不適，請告知護理人員。
- 三、隨時觀察牽引的功能，注意自黏膠帶或彈性繃帶是否鬆脫。
- 四、可將床單摺成捲軸置於患肢外側，以避免患肢腿部外旋。
- 五、多攝取含高纖維素之食物，及增加水份攝取(限制水份者除外)，以預防便秘。
- 六、需維持持續性牽引，勿自行鬆脫或間斷。
- 七、觀察牽引之患肢末梢血循、溫度、感覺有否異常。
- 八、維持牽引的正常功能：
 - (一)牽引繩不可附著任何物體或衣物，以免影響牽引力量。
 - (二)磅錘不可任意取下，及遠離地面及滑輪，以免影響牽引效果。
 - (三)牽引時雙腳應遠離床尾，否則牽引無效。
 - (四)患肢與牽引繩應保持一直線。



圖片來源：
<http://gladysadapple.pixnet.net/blog/post/55785536>