

國仁醫院

S-10傷口引流管護理指導

一、目的

於傷口內放置引流管，移除傷口周圍的血水、滲液、膿液，以避免壓迫刺激週圍器官組織及預防感染，以促進傷口癒合。



二、照護之注意事項

(一)防止移位或滑脫：下床活動時請使用安全別針或夾子，將引流管固定於衣服上；臥床時請將引流管固定於床上。

(二)預防感染：

- 1.請採半坐臥姿勢，並儘可能及早下床活動，以維持良好的引流功能。
- 2.引流袋(瓶)保持在腰部以下，以防止逆流。
- 3.引流液達袋子一半時，請告知護理人員以排空引流袋。
- 4.傷口紗布滲溼時，請告知醫護人員給予換藥。
- 5.請勿將引流袋垂於地板上。
- 6.翻身時請避免壓迫及扭曲引流管，以避免造成阻塞。
- 7.請勿自行調整引流管上的蓋子，以維持引流管的密合性。

(三)當引流液量少時，醫師會視情況予以拔除。

(四)若有以下情形，請告知醫護人員：

- 1.發燒、腹痛、引流管脫落。
- 2.引流袋異常膨脹或漏氣、引流液突然減少、無引流量或大量鮮紅色血液。
- 3.引流管傷口紅、腫、熱、痛、膿樣分泌物。

圖片來源：

<http://gladysadapple.pixnet.net/blog/post/55785536>