

國仁醫院

S-21手術後注意事項

- 若您手術後未放置導尿管，須於術後6-8小時內解尿，如膀胱脹仍未解尿時，請通知醫護人員。
- 因全身麻醉後痰液較不易咳出，請每1~2小時做深呼吸及咳嗽，以增加肺部擴張及幫助痰液咳出。
- 感到傷口疼痛時，可告知醫護人員，會針對您的情況適時使用止痛劑，以減輕傷口疼痛。
- 採腰椎（半身）麻醉者，手術後需完全平躺6小時；如有感覺背部不適時可左右移動身體，但絕對不可以抬高頭部。
- 如醫師已准許您可下床活動，請儘量配合，每次下床時請先坐於床緣5-10分鐘，再由他人扶持走動(第一次下床活動務必有人陪伴)。
- 手術後身上可能會有一些導管留置，如點滴、鼻胃管、導尿管及傷口引流管等，請注意管路的固定，勿拉扯引流管。
- 手術後須經醫師許可方可進食，進食時請保持坐姿，如無飲食及水份禁忌時請多補充水份，加強蛋白質及維生素等營養攝取。
- 手術後當天或隔天即可用溫水將全身擦淨，可用棉籤沾溫開水清洗牙齒或漱口。
- 手術後若有以下情形，請告訴醫護人員：
發燒，劇烈嘔吐、引流管脫落、
傷口紅、腫、熱痛或出現膿樣分泌物、
傷口敷料滲濕(或大量滲血)。

